



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Больфо® ошейник

(Организация-разработчик: «Bayer Animal Health GmbH», Kaiser-Wilhelm-Allee 20, D-51373 Leverkusen, Germany/ «Байер Энимал Хелс ГмбХ», Кайзер-Вильгельм-Аллее 20, D-51373 Лёверкузен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-6.14-2118№ПВИ-3-0.2/01188

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: *Больфо® ошейник (Bolfo® collar)*; международное непатентованное наименование действующего вещества: пропоксур.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Больфо® ошейник содержит действующее вещество пропоксур: в ошейнике для собак средних и крупных пород – 4,442 г, в ошейнике для собак мелких пород и кошек – 1,234 г и вспомогательные вещества: дибутил адипат, диоктил фталат, эпоксицированное соевое масло, стеариновую кислоту, поливинилхлорид и смесь красителей.

3. По внешнему виду препарат представляет собой полимерную ленту коричневого цвета с нанесенным номером серии и 2 или 3 петлями для фиксации.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет с даты производства. Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат *Больфо® ошейник* для собак крупных и средних пород длиной – 70 см, для собак мелких пород и кошек – 38 см, в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, помещенных поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 30°C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Больфо® ошейник относится к группе инсектоакарицидных средств.

10. Пропоксур (2-изопропоксифенил-N-метилкарбамат), входящий в состав препарата, постепенно выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного, оказывая длительное инсектоакарицидное действие на блох и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках.

Пропоксур является активным ингибитором эстеразных систем организма членистоногих, стимулирует гликолиз и тормозит окислительное фосфорилирование, что приводит к нарушению биохимических процессов, параличу и гибели эктопаразитов.

Больфо® ошейник по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых условиях не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия. Токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Больфо® ошейник применяют с целью уничтожения блох и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках и кошках, а также для защиты животных от их нападения, особенно в теплое время года (в период повышенной активности паразитов).

12. Противопоказанием к применению препарата Больфо® ошейник является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Больфо® ошейник не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также щенкам и котятм моложе 3-месячного возраста.

13. При работе с препаратом Больфо® ошейник следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Животное с ошейником не следует подпускать к маленьким детям.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Больфо® ошейник. В случае появления аллергических реакций

или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Применение препарата Больфо® ошейник беременным и кормящим животным, при необходимости, возможно после консультации с ветеринарным врачом.

15. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают, с внутренней стороны удаляют пластиковые перемычки и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0-1,5 см, затем пропускают свободный конец ленты через петли и излишек срезают.

Непрерывное использование лекарственного препарата Больфо® ошейник обеспечивает защиту животных от иксодовых клещей на протяжении 2,5 месяцев, от блох – на протяжении 4 месяцев.

Действие препарата проявляется через несколько часов, учитывая это, применение ошейника следует провести не позднее, чем за 24 часа до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания эктопаразитов (парки, скверы, лес). В редких случаях при применении препарата Больфо® ошейник возможно обнаружение иксодовых клещей на животном, но через 1- 2 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

Эффективность препарата зависит от состояния шерстного покрова, поэтому перед его применением животных с жесткой, спутанной или грязной шерстью, рекомендуется тщательно вымыть. Частый контакт с водой может снизить эффективность препарата Больфо® ошейник, поэтому перед купанием или мытьем животного его рекомендуется снять и вновь надеть после того, как шерсть животного полностью высохнет.

16. При применении препарата Больфо® ошейник в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. При случайном попадании частей ошейника внутрь у животного возможны симптомы отравления карбаматами (рвота, расстройство пищеварения, саливация), в этом случае рекомендуется применение средств симптоматической терапии и холинолитиков.

17. При передозировке лекарственного препарата у некоторых собак могут наблюдаться повышенная саливация, сужение зрачков, рвота, диарея. В этом случае ошейник снимают, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять лекарственный препарат Больфо® ошейник одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особенности действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

20. Больфо® ошейник применяют непрерывно в течение сезона активности паразитов. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению его эффективности.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH», Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany/ «КВП Фарма + Ветеринэр Продукте ГмбХ», Пројенсдорфер штрассе 324, D-24106 Киль, Германия

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Эланко Рус», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, эт.16, пом. 1Б, ком.13.

Специалист по регистрации
ООО «Эланко Рус»



О.В. Монахов