

Виттри-3

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Виттри-3 для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д₃, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у животных

Согласовано Заместителем Руководителя Россельхознадзора Неполюновым Е. А. (Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агрорезащита», г. Москва).

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата: Виттри-3 (Vittry-3).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: витамин А + витамин Д₃ + витамин Е.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Виттри-3 содержит (в 1 мл) в качестве действующих веществ: витамин А – 30000 МЕ, витамин Д₃ – 40000 МЕ, витамин Е – 20 мг, а также вспомогательное вещество: растительное масло (масло подсолнечное рафинированное; масло рапсовое; масло соевое рафинированное; масло кукурузное; масло хлопковое; масло оливковое; масло персиковое).

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слегка мутную маслянистую жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Запрещается применение Виттри-3 по истечении срока годности.

Выпускают препарат расфасованным в полимерные флаконы или во флаконы из темного стекла соответствующей емкости.

Хранят Виттри-3 в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°С до 25°С. Виттри-3 следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Виттри-3 относится к комбинированным витаминным препаратам. Препарат оказывает синергидное действие на организм животных, выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактике гиповитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Виттри-3 по степени воздействия на организм относится к малопаспным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.001.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Виттри-3 применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д₃, Е, ксерофтальмии, рахита, остеомалации, тетании, энцефаломалации, токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек у млекопитающих, а также для повышения их плодовитости и жизнеспособности молодняка.

Противопоказания не установлены.

Препарат вводят внутримышечно или подкожно животному в дозах (на голову в сутки):

Номер регистрационного удостоверения:

в РОССИИ 77-3-12.12-0745 № ВПР-3-5.0/00538 от 23.05.2012

в АРМЕНИИ №10095 от 03.12.2010

в ГРУЗИИ №000412 от 09.03.2015

в КЫРГЫЗСТАНЕ №159 от 11.07.2014

Вид животных	мл
Крупный рогатый скот, лошади (взрослые поголовье)	2-5
Крупный рогатый скот, лошади (молодняк)	1-2
Овцы, козы (взрослые поголовье)	1
Овцы, козы (молодняк)	0,5
Свины (взрослые поголовье)	1,5
Свины (молодняк)	0,5
Собаки	0,25-0,5
Кошки	0,15
Песцы и лисы	0,25
Норки	0,1-0,15

С профилактической целью препарат вводят животным внутримышечно или подкожно один раз в 2-3 недели, с лечебной – один раз в 7-10 дней.

Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5-2 месяца до опороса, коровам – за 3-4 месяца до отела.

С лечебной целью доза может быть повышена до трехкратного количества.

Симптомы передозировки у животных не выявлены.

Особенностей действия препарата при его первом применении или отмене не выявлено.

Препарат разрешен для применения в период беременности и лактации. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

При применении Виттри-3 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. Виттри-3 совместим с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

Продукцию животноводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с Виттри-3 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Виттри-3. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.



Производитель, уполномоченный на принятие претензий от потребителя: ООО «АВЗ С-П» Россия, 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).

Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmag.ru